

DICHLOREXAN

Solución Tópica 2% Coloreada



DESCRIPCIÓN

DICHLOREXAN Solución Tópica 2% Coloreada, formulada con colorantes naturales libre de alcohol, es un antiséptico que altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que le confiere una potente acción antimicrobiana. Aplicada a un rango de pH 5-8 tiene acción bactericida rápida y eficaz sobre microorganismos grampositivos y algunos gramnegativos, pero es inactivo sobre bacterias ácido resistentes, esporas y virus. La mayor parte de las cepas de *Pseudomona Aeruginosa* y de *Proteus* de origen hospitalario son resistentes a la acción de la clorhexidina.

Producto hipoalergénico, testado Dermatológicamente.

→ FÓRMULA

Cada 100 mL de solución tópica contiene:

Gluconato de Clorhexidina 20 %.....10,00 g

Excipientes: glicerol, propilenglicol, alcoholes grasos etoxilados, Colorante FD&C Azul N° 1, Colorante FD&C Amarillo N° 5, Colorante D&C rojo N° 33, agua purificada cs.

→ INDICACIÓN

DICHLOREXAN Solución Tópica 2% Coloreada, es una solución acuosa para antisepsia de piel. Es de uso tópico para la limpieza, desinfección y demarcación preoperatoria de la piel.

DICHLOREXAN

Solución Tópica 2 % Coloreada

→ INSTRUCCIONES DE USO

Lavar el campo operatorio con abundante agua y con jabón Dichlorexan, enjuagar y repetir el proceso. Secar con paño o compresas estériles. Aplicar DICHLOREXAN Solución Acuosa 2% Coloreada con tórula o gasa estéril frotando sobre la piel en cantidad suficiente como para cubrir todo el campo operatorio. Dejar secar por 3 minutos aproximadamente para lograr efecto óptimo y repetir si es necesario.

Aplicación en neonatos: Usar según indicación médica.

→ SEGURIDAD DE USO

Los estudios toxicológicos demuestran que la clorhexidina no se absorbe a través de la piel sana, no es tóxica y posee un bajo potencial de irritación.

Se ha demostrado que la clorhexidina es toxica a nivel de mucosas y además posee efecto ototóxico.

Tiene buena compatibilidad con pH normal de la piel.

→ CONTRAINDICACIONES

No utilizar en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la clorhexidina, a los componentes de la formulación especialmente a los colorantes.

No utilizar sobre mucosas.

→ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso externo.

Evitar contacto con ojos, oídos y boca.

En caso de salpicaduras en los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión consulte con su médico.

Mantener en lugar fresco a no más de 25 °C y protegido de la luz. No mezcle con otros productos químicos o detergentes.

No utilizar en neonatos prematuros sin indicación médica.

No usar en piel dañada o quemada, en forma extensa.

No utilizar en antisepsia vaginal.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

→ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Solución Acuosa
Color	Café
pH	5,0 – 6.0
Concentración Activo	2 %

→ PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Disponible en frascos de 50cc y 125cc.

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

REGISTRO ISP N° 18108/10